

FENAER APOYA LA RETIRADA DE LA EXENCIÓN EN EL USO DE MASCARILLAS A PACIENTES RESPIRATORIOS

No existen evidencias de que la mascarilla desestabilice a este tipo de pacientes, y sí de que protege de contagios que pueden derivar en patologías graves

La Federación recomienda uso del tipo FFP2 siguiendo las indicaciones de Separ

La Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer) se suma a diversos colectivos científicos para pedir al Gobierno que retire las exenciones al uso de mascarillas por parte de pacientes respiratorios. La Federación recuerda que no existen evidencias de que estos elementos de protección afecten negativamente a quienes sufren este tipo de afecciones, mientras que sí está demostrado que protegen del contagio de coronavirus y, en consecuencia, previenen enfermedades que podrían ser muy graves para la población de riesgo.

Desde mayo, el BOE regula el uso de mascarillas tanto en espacios públicos cerrados como en lugares abiertos, y también las exenciones a esta norma. Entre ellas destaca la de "personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla y a aquellas cuyo uso se encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad". Sin embargo, y de acuerdo con todas las investigaciones, estas excepciones están injustificadas. La literatura científica actual desmiente que los pacientes con EPOC, asma o cualquier otra patología respiratoria puedan sufrir problemas por usar este tipo de filtros.

Es el caso del [estudio publicado este martes](#) por el [Respiratory Effectiveness Group](#), un grupo de investigadores independientes europeos que, después de revisar los miles de publicaciones sobre Covid-19 disponibles, llega a la conclusión de que las mascarillas no desestabilizan a las personas con problemas respiratorios que las usan.

Más aún, el uso de mascarilla en pacientes respiratorios es especialmente crucial, dado que sus posibilidades de contagiarse con el coronavirus SARS-CoV-2 son iguales que las de una persona sana, pero es mucho más probable que desarrollen afecciones mucho más graves como neumonía severa.

Por ello, Fenaer se suma a las diversas sociedades médicas y personalidades científicas que solicitan al gobierno que retire del BOE tal exención, y recomienda a los pacientes respiratorios que utilicen mascarillas para evitar contagios. Según responsables de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), [los modelos FFP2 son los más indicados](#) para este tipo de afecciones.

7/10/2020

Gabinete de Comunicación

T. 660 396 807 – comunicacion@fenaer.es